

Primeros auxilios

Atropello

Tu puedes haber visto el accidente, o tu perro regresa obviamente herido. Asegúrate de que pones a tu perro en lugar seguro. Procura que este quieto, y lo más confortable posible; átalos si es necesario para prevención de mayores daños. Aplica presión en los puntos en donde esté sangrando, con una venda o alguna prenda. Llama a tu veterinario lo más pronto posible, para saber que tienes que hacer exactamente.

Corte en la pata

A menudo se pueden producir cortes en las patas debido a cristales u objetos punzantes. Si sangra mucho, envuelve su pata en gasa o en una tela limpia y ponle esparadrapo alrededor, intentando que la presión sea uniforme. No uses nunca una goma elástica o torniquete alrededor del miembro, especialmente por periodos de tiempo largos (más de quince minutos).

Herida en el ojo

Mira en el ojo y quita cuidadosamente cualquier cuerpo extraño, como semillas. Puedes hacerlo enjuagando el ojo con agua limpia y templada. Evita que se toque el ojo con las patas y llévalo al veterinario inmediatamente.

Vómitos

Es normal que los perros vomiten ocasionalmente. Sólo si esto ocurre frecuentemente o el animal parece decaído debes preocuparte. Si vomita de forma continuada, observa como lo hace y el tipo de vómitos, y descríbelos a tu veterinario. Puede que necesites tomar alguna muestra en una botella para que él la examine. No le des de comer.

Diarrea aguda

La diarrea aguda puede contener sangre e ir acompañada de vómitos. Quítale toda la comida y manténlo en un lugar cálido. Dale pequeñas cantidades de agua con azúcar o caldo ligero. Si está débil o deprimido, llévalo al veterinario inmediatamente. Si está normal, puedes llevarlo a la mañana siguiente en las horas de consulta normales. Puedes telefonar primero al veterinario y tomar nota de sus consejos.

Picaduras de insectos

Las picaduras de avispas, otros insectos o arañas, pueden conllevar dolor agudo, hinchamiento y decoloración de la piel. Si la picadura es en la garganta, la respiración puede ser dificultosa. Mantenlo en un lugar fresco y evita que se mueva. Si el hinchamiento persiste durante más de una hora, o si la picadura es en la cara o en el cuello, llévalo al veterinario. Manténle la lengua delante e intenta que tenga espacio libre para respirar.

Convulsiones o ataques

Son movimientos espasmódicos, a menudo con temblor de las mandíbulas, acompañados de salivación. El perro puede caerse sobre un costado. Puede haber movimiento violento de los músculos de la cabeza, cuello y miembros.

Quítale el collar y asegúrate de que está alejado de cualquier peligro (escaleras, sitios inestables, etc...). Asegúrate de que puede respirar manteniendo su cuello estirado, pero no pongas los dedos dentro de la boca. Mantén el sitio oscuro y tranquilo y evita ruidos bruscos. La mayoría de estos ataques acaban rápidamente (aunque parecen interminables). Anota los síntomas antes, durante y después del ataque, y llama al veterinario.

Dolor de oídos

Puedes ver que se rasca o ladea la cabeza. Puede que se frote contra el suelo, agite la cabeza, se queje, o no quiera que le toquen. Si ocurre de repente, puede ser algo de hierba o algún objeto extraño. No pongas nada en contacto con el oído y llama a tu veterinario.

Estos problemas deben atenderse inmediatamente, antes de que la situación pueda agravarse.

Envenenamiento con un producto conocido

Si observas que traga algún producto venenoso, intenta que vomite haciéndole tragar agua salada (una cucharadilla en un vaso de agua). Dale leche solo en el caso de que la sustancia sea corrosiva. No les des más de una vez, y no les des en absoluto si el perro no puede mantenerse en pie. Llama al veterinario inmediatamente y toma el resto del veneno o la botella.

Atragantamiento

El perro puede estar dándose con las patas en la boca. Trata de abrísela y quitarle el objeto del interior. Puede que te muerda haciendo esto.

Mira en el paladar, pues a veces los huesos se quedan atascados ahí. En algunos casos se necesita anestesia general para quitar el objeto. Incluso si consigues quitárselo, conviene visitar al veterinario.

Posible embarazo no deseado

Si tu perra es cubierta accidentalmente, esto no es una emergencia, estrictamente hablando, pero a menudo el embarazo puede evitarse. El veterinario puede ponerle una inyección poco después, que normalmente evitará que éste progrese. Es necesario contactar con el veterinario dentro de las 24 horas siguientes.

Colapso

Llama al veterinario inmediatamente. Ponlo en una manta y mantén su boca abierta para que pueda respirar.

Eruptos

Si el abdomen aparece hinchado y lleno de gas, VE A UNA CLINICA VETERINARIA INMEDIATAMENTE.

Transporte del perro en una emergencia

Normalmente es preferible llevárselo al veterinario a que él venga a casa. Esto es porque en la consulta tiene personal y equipo especializado. No des a tu perro nada de comer o beber, debido a que puede necesitar anestesia general.

Pon tu perro cuidadosamente en una manta o abrigo en el suelo y levántalo de los lados de la manta, para evitar estirar de las patas en prevención de mayores heridas. Dos personas pueden llevarlo y ponerlo en el asiento trasero del coche. Una persona debe estar con él. Si pretende morder, ponerle temporalmente una banda alrededor del hocico. No dejárselo mucho tiempo, pues puede comprometer su respiración.

Notificar al veterinario que vais en camino, para que se pueda preparar para vuestra llegada.